

# Dacudoses

## Solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose

### COMPOSITION

Acide borique (0,180 g), Borax (0,120 g), concentré de rose turque, chlorure de sodium, eau purifiée QSP un flacon unidose de 10 ml.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour lavage oculaire en récipient unidose ; récipient unidose de 10 ml.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTISEPTIQUE LOCAL A USAGE LOCAL

OPHTALMOLOGIQUE (S : Organes sensoriels).

### INDICATION THERAPEUTIQUE

Lavage oculaire en cas d'irritation conjonctivale.

### CONSERVATION

**a) Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.**

**b) Précautions particulières de conservation.**

Jeter le récipient unidose immédiatement après usage.

Ne pas réutiliser un récipient unidose déjà entamé.

**NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.**

### EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Gêne visuelle passagère après instillation de la solution ophtalmique. **SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

**ATTENTION !**

**a) Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament :**

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans le cas suivant : Allergie à l'un des constituants de la solution.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**b) Mises en garde spéciales :**

Ne pas injecter, ne pas avaler.

**c) Précautions d'emploi :**

Le récipient unidose doit être jeté immédiatement après usage et ne doit pas être conservé en vue d'une réutilisation lors des administrations suivantes.

En cas de traitement concomitant par un deuxième collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :** l'efficacité d'un collyre peut être perturbée par l'instillation simultanée d'un autre collyre. Dans ce cas, il convient d'attendre 15

minutes avant de pratiquer la deuxième instillation. AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**e) Grossesse – Allaitement :** D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

## **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?**

**a) Posologie :** 1 à 4 lavages ou applications par jour, selon les besoins. Chaque récipient unidose contient une quantité suffisante de médicament pour un traitement des deux yeux.

**b) Mode et voie d'administration :** Voie locale. EN LAVAGE OCULAIRE. Se laver soigneusement les mains. Les lavages se font de façon directe par jet de pression douce. Retournez le flacon et appuyez légèrement sur celui-ci, en prenant garde de ne pas mettre en contact le flacon avec la surface de l'œil et en essuyant l'excédent avec une compresse ou du coton hydrophile.

**c) Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré :** En cas de traitement simultané par un deuxième collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

### **FABRICANT**

Gifrer Barbezat, 8-10 rue Paul Bert  
69150 Décines

### **EXPLOITANT**

Laboratoires Théa  
12 rue Louis-Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

### **DATE DE REVISION DE LA NOTICE :**

Avril 2011.

Médicament autorisé n° : 3 400 934 796 708