DOSISEPTINE® 0,05 %

Gluconate de chlorhexidine à 0,05%

SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE EN RECIPIENT UNIDOSE

COMPOSITION

Gluconate de chlorhexidine ..... 50,0 mg
Excipients : Nonoxinol 10, Gluconolactone,
Eau purifiée q.s.p. ..... 100 ml

FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour application locale : Unidose stérile de 5 ml boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : Antiseptique (D. Dermatologie).

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT : Laboratoires GIFRER BARBEZAT - 8-10, rue Paul Bert - 69153 DECINES CEDEX.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est un antiseptique (il lutte contre la prolifération des microbes). Ce médicament est préconisé dans l'antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : • Allergie à la Chlorhexidine (ou un médicament apparenté) • Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles, sur les muqueuses (nez, gorge, muqueuses génitales).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDES SPECIALES : Ce médicament est réservé à l'usage externe. • Il ne doit pas être utilisé pour l'antisepsie des zones de ponctions ou d'injections, ni pour la désinfection du petit matériel chirurgical. • Il ne doit pas être utilisé en cas de plaies profondes et étendues sans avis médical. • Il ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 30 mois sans avis médical.
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants (risque d'incompatibilité et d'inefficacité du produit).
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT TOUJOURS SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE : NE JAMAIS AVALER. 2 applications par jour. La solution est prête à l'emploi. Elle peut être appliquée directement sur les plaies.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie cutanée.

CONDITION DE DELIVRANCE : CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE : • Il peut ne pas être adapté à un autre cas. • Ne pas le conseiller à une autre personne. • Ne pas le réutiliser sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS : COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS. • Possibilité de réaction allergique (eczéma, éruption cutanée).
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUEE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Juin 2005

MEDICAMENT AUTORISE : Unidoses stériles de 5 ml, boîte de 20 359 746.4

En France métropolitaine, les Laboratoires GIFRER BARBEZAT participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. GIFRER BARBEZAT vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

Laboratoires GIFRER BARBEZAT

8-10, RUE PAUL BERT
69153 DECINES CEDEX

1061/2011