

Bétadine 10%

Solution pour bain de bouche (povidone iodée)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

1/- QU'EST-CE QUE BETADINE 10% solution pour bain de bouche ET DANS QUEL CAS EST-IL

UTILISE ? Préparations pour l'odontostomatologie / autres agents pour traitement oral local/divers.

Ce médicament est une solution antiseptique (contenant de l'iode) pour bain de bouche. C'est un traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et il permet les soins post-opératoires en stomatologie.

2- INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BETADINE Dermique 10% ? N'UTILISEZ JAMAIS

BETADINE dermique 10% : en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de réactions croisées avec les produits de contraste iodés. Les réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de Bétadine Dermique 10%. Les antécédents d'accidents de type allergique aux produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie (possibilité de réaction allergique) aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de ce médicament. Chez le nouveau-né prématuré et le nourrisson de moins d'un mois. De façon prolongée pendant les 2 et 3èmes trimestres de grossesse. EN cas d'allaitement.

Mise en garde : ce médicament ne doit généralement pas être utilisé : chez l'enfant de moins de 6 ans, en association avec les antiseptiques dérivés du mercure. Précautions d'emploi : en cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et / ou de fièvre associée, consulter un médecin ou votre spécialiste dentaire. L'iode contenu dans ce médicament peut traverser les muqueuses et passer dans la circulation générale (voir rubrique 4), cette spécialité contient des dérivés terpéniques (arôme menthe). L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (voir posologie). Pris en quantité importante ou de façon répétée : ce médicament peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, ce médicament est susceptible de retentir sur le fonctionnement de la thyroïde ou de provoquer des interférences avec les explorations fonctionnelles de la glande thyroïde. En cas d'épilepsie ancienne ou récente. Demandez conseil à votre médecin, en cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre pharmacien ou de votre spécialiste dentaire.

Utilisation d'autres médicaments : l'utilisation concomitante d'antiseptiques dérivés du mercure est contre-indiquée. L'emploi simultané ou successif d'autres antiseptiques par voie locale buccale est à éviter. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement : en raison de la présence d'iode, l'usage répété de ce médicament est contre-indiqué à partir du 2^{ème} trimestre de la grossesse ou en cas d'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : arôme menthe (huile essentielle de menthe, alcool).

3- Comment utiliser Bétadine 10%, solution pour bain de bouche ?

Posologie : réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Utilisation locale en bain de bouche. Ne pas avaler. La posologie est de 1 à 2 cuillerées à café dans un verre d'eau tiède, en bain de bouche, 4 fois par jour. Mode d'administration, fréquence d'administration, durée du traitement : se conformer à l'avis de votre spécialiste dentaire.

En cas de surdosage : un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation. En cas d'ingestion orale massive susceptible d'entraîner une intoxication grave, celle-ci est à traiter en milieu spécialisé : troubles gastro-intestinaux et/ou électrolytiques, en particulier chez les insuffisants rénaux. Une surveillance de la fonction thyroïdienne est recommandée. En cas d'oubli d'une dose : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Reprenez le cours normal de votre traitement.

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ? Comme tous les médicaments, Bétadine 10%, solution pour bain de bouche est susceptible d'avoir des effets indésirables. Bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Exceptionnellement, des réactions d'hypersensibilité (allergie) : urticaire, œdème de quincke, choc anaphylactique (allergique), réactions anaphylactoïde, ont été décrites avec des produits contenant de la povidone, dont Bétadine. En cas d'apparition de réactions cutanées, le traitement doit être arrêté immédiatement. En cas d'administrations répétées et d'usage exagéré, ce produit peut, d'une part se révéler irritant pour les muqueuses, d'autres parts il peut se produire une surcharge iodée susceptible d'entraîner un dysfonctionnement de la glande thyroïde. Possibilité d'irritations se manifestant au niveau des muqueuses. En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées, possibilité d'agitation et de confusion mentale chez les sujets âgés. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5- Comment conserver Bétadine 10%, solution pour bain de bouche ? Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas dépasser la date de péremption mentionnée sur le flacon. Pas de précautions particulières de conservation.

6- Informations supplémentaires

La substance active est : Povidone iodée 10.00g pour glycérol à 85 pour cent, arôme menthe, saccharine sodique, hydroxyde de sodium, eau purifiée. Solution pour bain de bouche. Flacon de 125 ml.

Titulaire et exploitant : Meda Pharma 25 bd de l'amiral bruix 75016 – paris tél. 0456641070 sous licence NAPP

Fabricant : MEDA Manufacturing

Av JFK – 33700 Mérignac

Date d'approbation de cette notice : 07/2007

Médicament autorisé : n° 3400931528746