

BRONCHODERMINE ®

Suppositoires

Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

**ATTENTION, CETTE SPECIALITE CONTIENT DES DERIVES TERPENIQUES.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE**

COMPOSITION

Suppositoires	NOURRISSON	ENFANT	ADULTE
CINEOLE	0.01000 g.....	0.0200 g.....	0.040 g
CHIORHYDRATE D'AMYLEÏNE	0.00125 g.....	0.0025 g.....	0.005 g
GAÏACOL LIQUIDE.....	0.05000 g.....	0.1000 g.....	0.200 g
HUILE ESSENTIELLE DE PIN RECONSTITUEE.....	0.01250 g.....	0.0250 g.....	0.050 g
Pour un suppositoire de:.....	1.00000 g.....	2.0000 g.....	3.000 g

Excipients: rocou, triglycérides semi-synthétiques.

FORME PHARMACEUTIQUE

Suppositoire, boîte de 10.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ASSOCIATION A VISEE ANTISEPTIQUE ET EXPECTORANTE (R : Système respiratoire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement d'appoint des affections bronchiques aiguës bénignes chez le nourrisson à partir de 1 mois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas :

- allergie aux anesthésiques locaux (amyléine),
- lésions récentes de l'anus et du rectum (contre-indication liée à la voie d'administration).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques (cinéole, huile de pin) qui ont pu entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson : respecter les posologies et les durées de traitement préconisées.

Un avis médical est nécessaire:

- en cas d'expectoration grasse ou purulente,
- si le nourrisson est atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

En raison de la toxicité neurologique potentielle des dérivés terpéniques (cinéole, huile de pin) chez les nourrissons, éviter la prise de ce médicament en cas d'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

BRONCHODERMINE NOURRISSONS

- **Réservé aux nourrissons à partir de 1 mois**
- de 1 à 6 mois : 1 suppositoire par jour
- de 6 à 12 mois : 2 suppositoires par jour
- de 12 à 30 mois : 3 suppositoires par jour

BRONCHODERMINE ENFANTS

- **Réservé à l'enfant à partir de 30 mois**
- à partir de 30 mois jusqu'à 6 ans : 1 suppositoire par jour
- de 6 à 10 ans : 2 suppositoires par jour
- de 10 à 15 ans : 3 suppositoires par jour.

BRONCHODERMINE ADULTES

- **Réservé à l'adulte**
- 1 à 3 suppositoires par jour.

Ce médicament vous a été personnellement délivré dans une situation précise. Il peut ne pas être adapté à un autre cas. Ne pas le conseiller à une autre personne.

Voie rectale.

Le choix de la voie rectale n'est déterminé que par la commodité d'administration du médicament.

Ne pas dépasser quelques jours de traitement. Si les troubles persistent, consultez votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Possibilité de troubles digestifs (nausées, vomissements)
- En raison de la présence de dérivés terpéniques (cinéole, huile de pin) et en cas de non respect des doses préconisées, risque de convulsions chez le nourrisson.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.,
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OUA VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT
QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25° C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

juin 2004

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

S.E.R.P. – Immeuble le Triton - 5, rue du Gabian - 98000 Monaco

B 6019 140 001-2