

PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop

Sulfogaïacol/ Benzoate de sodium

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop ?
3. COMMENT PRENDRE PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, SIROP ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

EXPECTORANTS

(R: Système respiratoire)

Ce médicament est un modificateur des sécrétions bronchiques.

Il est préconisé en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration (difficultés à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques) chez l'enfant et le nourrisson.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, SIROP ?

Ne prenez jamais PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop dans les cas suivants:

- en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants (notamment au benzoate de sodium, au parahydroxybenzoate de méthyle).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop:

Mises en garde spéciales

ATTENTION: LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MEDICAMENT EST DE 3,8° SOIT 150 mg D'ALCOOL PAR CUILLERE A CAFE.

Un avis médical est nécessaire:

- en cas d'expectoration grasse ou purulente,
- si l'enfant est atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

Ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Précautions d'emploi

En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, prévenez votre médecin.

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose (3,1 g par cuillère à café).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop

Liste des excipients à effet notable:

Saccharose (3,1 g par cuillère à café),

Ethanol (150 mg par cuillère à café),

Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218).

3. COMMENT PRENDRE PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, SIROP ?

Posologie

Nourrisson et enfant de moins de 5 ans: 1 cuillère à café, 2 à 3 fois par jour.

Enfant de plus de 5 ans: 1 cuillère à café, 3 à 5 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale

Durée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

Si vous avez pris plus de PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop que vous n'auriez dû:

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- possibilité de troubles digestifs (nausées, vomissements), allergie.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, SIROP ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop ?

Les substances actives sont:

Sulfogaïacol 1,174 g

Benzoate de sodium 2,268 g

Pour 100 ml de sirop.

Titre alcoolique (V/V): 3,8°

1 cuillère à café contient 3,1 g de saccharose et 150 mg d'éthanol.

Les autres composants sont:

Teinture de Grindélia, extrait concentré pour sirop de Tolu, extrait concentré pour sirop de Polygala, arôme naturel de fleur d'oranger, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 218), arôme caramel, acide citrique monohydraté, solution de saccharose, eau purifiée.

Qu'est-ce que PASSEDYL ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sirop en flacons de 125 ml, 150 ml et 180 ml.

Titulaire

LABORATOIRES URGO SOINS & SANTE
42, RUE DE LONGVIC
BP 157
21304 CHENOVE CEDEX

Exploitant

LABORATOIRES URGO
9, RUE PETITOT
21000 DIJON

Fabricant

LABORATOIRES URGO
AVENUE DE STRASBOURG
ZONE EXCELLENCE 2000
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19/10/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).