alodont®

solution pour bain de bouche
chlorure de cetylpyridinium - chlorobutanol hémihydraté - eugenol

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION
Alodont, solution pour bain de bouche

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chlorure de cetylpyridinium	5,0000 mg
Chlorobutanol hemihydrate	50,000 mg
Eugenol	4,0000 mg

Excipients : alcool, huile de ricin hydrogénée et polyoxyéthylénée 25, hydroxyde de sodium, acide citrique monohydraté, huile essentielle de menthe poivrée, saccharine sodique, bleu patenté V (E131), eau purifiée.

Pour 100 g de solution

FORME PHARMACEUTIQUE
Solution pour bain de bouche, flacons de 200 ou 500 ml.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
STOMATOLOGIE / TRAITEMENT LOCAL A VISEE ANTISEPTIQUE
(A : appareil digestif et métabolisme)

TITULAIRE / EXPLOITANT :
Laboratoires TONIPHARM
3 Rue des Quatre Cheminées
92100 Boulogne

FABRICANT :
FAMAR Orléans
5, avenue de Concyr
45071 ORLEANS CEDEX 2

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un bain de bouche.
Il est préconisé dans le traitement local d'appoint des infections de la bouche ou en soins après une intervention chirurgicale de la cavité buccale.

3. ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- Allergie connue à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES
L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.
Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (*Cf. rubrique POSOLOGIE*).
Ce médicament contient de l'huile de ricin et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple eczéma).

PRECAUTIONS D'EMPLOI
En cas d'aggravation des symptômes ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : ***CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.***
En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.
D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS
Huile de ricin hydrogénée et polyoxyéthylénée 25.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE
RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 7 ANS.
Utilisation locale en bains de bouche.
Ne pas avaler.
Chez l'adulte : 3 bains de bouche par jour avec du produit pur, garder le produit une minute dans la bouche.
Chez l'enfant de 7 à 12 ans : 3 bains de bouche par jour avec du produit dilué à 50% avec de l'eau.
Ce médicament vous a été personnellement délivré ou prescrit dans une situation précise :
- il ne peut pas être adapté à un autre cas.
- Ne pas le conseiller à une autre personne.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Utilisation locale en bains de bouche.
Ne pas avaler.

DUREE DU TRAITEMENT
Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
(EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :
- risque de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant,
- possibilité d'agitation et de confusion chez les sujets âgés.

Très rarement les effets indésirables suivants ont été rapportés : irritation de la bouche et réaction allergique systémique.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'AFSSAPS. La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Février 2011.