NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

RECTOPANBILINE
ADULTES

SUPPOSITOIRES

Bile de bœuf (extrait de)

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire?
3. Comment utiliser RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE RECTOPANBILINE ADULTES, SUPPOSITOIRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un suppositoire. Il est préconisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER RECTOPANBILINE ADULTES, SUPPOSITOIRE ?

N'UTILISEZ JAMAIS RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire :
- si vous êtes allergique (*hypersensible*) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire,
- enfant de moins de 12 ans, sauf prescription médicale.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

FAITES ATTENTION AVEC RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire:

Mises en garde spéciales

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

Constipation occasionnelle:

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée):

Elle peut être liée à deux causes:
- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres:
- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...)
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi
Il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament dans les cas de poussées hémorroïdaires, de fissures anales, de rectocolite hémorragique.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

PRISE OU UTILISATION D'AUTRES MEDICAMENTS
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

GROSSESSE-ALLAITEMENT
Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé ponctuellement pendant la grossesse et l'allaitement.
D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER RECTOPANBILINE ADULTES, SUPPOSITOIRE?

Posologie
Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.
Adultes: 1 suppositoire adulte 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle à renouveler 1 fo dans la demi-heure ou l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire est susceptible d'avoir des effe indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :
• sensation de brûlures anales.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effe indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER RECTOPANBILINE ADULTES, SUPPOSITOIRE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire après la date de péremption mentionnée sur boîte.
A conserver à une température inférieure à 25° C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demand à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de proté l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire ?
La substance active est:
Extrait fluide biliaire titré à 12,86 % en acide cholique 0,700
Extrait fluide biliaire:
Extrait de bile de bœuf titré à 45 % (m/m) en acide cholique 0,200
Eau potable 0,500
Pour 1 suppositoire

Les autres composants sont :
Essence d'anis, gélatine, colorant caramel (E 150), glycérol.

Qu'est ce que RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de suppositoire ; boite de 10 suppositoires.

Titulaire / Exploitant
MEDA PHARMA
25 BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX
75016 PARIS - Tél.: 01 56 64 10 70

Fabricant
MEDA MANUFACTURING
AVENUE J.F. KENNEDY
33700 MERIGNAC

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25 octobre 2011.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (Fran