

PREXIDINE® 0,12 pour cent

Chlorhexidine
Solution pour bain de bouche

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5026277



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que PREXIDINE O,12% et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PREXIDINE O,12% ?
3. Comment utiliser PREXIDINE O,12% ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PREXIDINE O,12% ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE PREXIDINE O,12% ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

STOMATOLOGIE/TRAIEMENT LOCAL A VISEE ANTISEPTIQUE

(A: Appareil digestif et métabolisme)

PREXIDINE O,12% est un traitement local de la bouche à visée antiseptique.

Ce médicament est un bain de bouche.

Il est indiqué pour le traitement local d'appoint des infections de la bouche, ou en soins après une intervention chirurgicale de la cavité buccale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT D'UTILISER PREXIDINE O,12% ?

N'utilisez jamais PREXIDINE O,12% dans le cas suivant :

- allergie à la chlorhexidine.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre chirurgien-dentiste ou de votre stomatologiste et/ou de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec PREXIDINE O,12%

Mises en garde spéciales

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

L'usage prolongé de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche et de la gorge. En cas d'aggravation des signes d'infection ou en l'absence d'amélioration au bout de 5 jours : **consultez votre chirurgien-dentiste ou votre stomatologiste.**

Précautions d'emploi

- Ne pas mettre le produit au contact des yeux.
- Ne pas introduire le produit dans le nez ou les oreilles.
- **NE PAS AVALER.**

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre chirurgien-dentiste, de votre stomatologiste ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

N'utilisez pas en même temps ou de façon rapprochée plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre chirurgien-dentiste, votre stomatologiste ou votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans les conditions normales d'utilisation de PREXIDINE O,12%, ce médicament n'est pas susceptible d'avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER PREXIDINE O,12% ?

Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Flacon de 200 ml : Pour chaque bain de bouche, utiliser le godet doseur en le remplissant jusqu'au trait (15 ml). En l'absence de godet, utiliser le contenu d'une cuillère à soupe de solution (15 ml).

Flacon de 500 ml : Utiliser le contenu d'une cuillère à soupe de solution (soit 15 ml).

Rincez soigneusement la bouche pendant une minute environ avec la solution pure.

Mode et voie d'administration

Utiliser localement en bains de bouche.
NE PAS AVALER.

Cette solution doit être utilisée pure, non diluée.

Les bains de bouche doivent être effectués APRES brossage des dents et rinçage.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Le nombre de bains de bouche est de 1 à 3 par jour.

Durée du traitement

Ne continuez pas le traitement pendant plus de 5 jours sans avis médical.

Si vous avez utilisé plus de PREXIDINE 0,12% que vous n'auriez dû

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation de cette solution en bain de bouche.

Si vous avez accidentellement cette solution PREXIDINE 0,12%, il est possible que vous éprouviez des symptômes à type de douleurs de l'œsophage ou de l'estomac. Dans tous les cas, consultez votre chirurgien-dentiste, ou votre stomatologiste ou votre médecin.

Chez l'enfant, si cette solution est avalée accidentellement, contactez votre médecin, en raison de la présence d'alcool.

Par ailleurs, cette spécialité contient des dérivés terpéniques, qui peuvent abaisser le seuil épileptogène et entraîner, à doses excessives, si PREXIDINE 0,12% est avalé accidentellement, des accidents neurologiques chez l'enfant (à type de convulsions) et chez les sujets âgés (à type d'agitation et de confusion). Respecter les posologies et la durée de traitement préconisées (voir paragraphes « Posologie » et « Mode et voie d'administration »).

En cas de projection accidentelle au niveau de vos yeux, rincez immédiatement et abondamment vos yeux à l'eau claire et consultez votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PREXIDINE 0,12% est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Coloration brune de la langue et des dents, particulièrement chez les buveurs de thé ou de café, disparaissant à l'arrêt du traitement
- Possibilité de réactions allergiques : irritations, réactions cutanées, gonflement des glandes salivaires. Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez le traitement et consultez un médecin.
- Possibilité d'altération du goût ou de sensation de brûlure de la langue en début de traitement.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance www.ansm.sante.fr.

5. COMMENT CONSERVER PREXIDINE 0,12% ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser PREXIDINE 0,12% après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient PREXIDINE 0,12% ?

- La substance active est :
Solution de gluconate de chlorhexidine à 20 pour cent
Quantité correspondant à gluconate de chlorhexidine : 0,120 g, pour 100 ml de solution pour bain de bouche.
 - Les autres composants sont :
Saccharine, glycérol, polysorbate 80, alcool, levomenthol, arôme menthe*, eau purifiée.
- *Composition de l'arôme menthe :
éthanol, menthol, acétate de menthyle, huile essentielle de menthe.

Qu'est-ce que PREXIDINE 0,12% et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour bain de bouche ; flacon de 200 ml ou 500 ml.

Titulaire/Exploitant

Laboratoires EREMPHARMA
25, rue Greffulhe
92300 LEVALLOIS-PERRET

Fabricant

DELPHARM TOURS
Rue Paul Langevin
37170 CHAMBRAY LES TOURS

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'ANSM (France).

LABORATOIRE
eReMPHARMA