SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT

Mis à jour : Mardi, 17 Février 2015.
Laxatif par voie rectale
Dans quel cas le médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT est-il prescrit ?
C'est un laxatif administré par voie rectale. Il déclenche une contraction du rectum qui permet l'évacuation des selles.
Il est utilisé dans le traitement de la constipation, notamment lorsque les selles s'accumulent dans le rectum et que les poussées répétées ne permettent pas de les évacuer. Il est également utilisé pour préparer le rectum avant un examen endoscopique (rectoscopie).
Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :
Constipation de bébé et de l'enfant
Constipation de l'adulte
Présentations du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT Adulte : suppositoire ; boîte de 10
- Non remboursé - Prix libre
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT Adulte : suppositoire ; boîte de 25 (en sac)
- Non remboursé - Prix libre
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT Adulte : suppositoire ; boîte de 50 (en sac)
- Non remboursé - Prix libre
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT Adulte : suppositoire ; boîte de 100 (en sac)
- Non remboursé - Prix libre
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT Enfant : suppositoire ; boîte de 10
- Non remboursé - Prix libre
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT Nourrisson : suppositoire ; boîte de 10
- Non remboursé - Prix libre
Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.
Composition du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT

	p suppos Ad	p suppos Enf	p suppos Nour
Glycérine	1,92 g	1,2 g	0,63 mg

Substance active : Glycérol
Excipients : Eau purifiée, Gélatine
Attention
Les laxatifs administrés par voie rectale ne doivent pas être utilisés de façon prolongée sans avis médical : ils risquent d'empêcher le réflexe normal d'expulsion des selles.
Des précautions sont nécessaires chez la personne atteinte d'hémorroïdes, de fissure anale ou de rectocolite hémorragique.
Fertilité, grossesse et allaitement
Ce médicament peut être utilisé de façon ponctuelle pour traiter la constipation de la femme enceinte ou qui allaite.
Mode d'emploi et posologie du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT
L'effet laxatif se manifeste après un délai de 5 à 30 minutes.
Posologie usuelle :
Adulte : 1 suppositoire Adulte par jour, à renouveler dans l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.
Enfant de plus de 6 ans : 1 suppositoire Enfant par jour, à renouveler dans l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.
Enfant de 2 à 6 ans : 1 suppositoire Enfant par jour.
Nourrisson : 1 suppositoire Nourrisson par jour, 1 jour sur 3.
Conseils
Le traitement de la constipation chronique repose essentiellement sur des boissons abondantes, une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière.

Effets indésirables possibles du médicament SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE MONOT
Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et, exceptionnellement, des inflammations du rectum.
Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en téléchargeant le formulaire.
Laboratoire Merck Médication Familiale