Diosmine EG® 300 mg et 600 mg
Comprimé pelliculé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

- *La substance active est :*
  Diosmine .....300 mg (Diosmine EG 300 mg)
  .....600 mg (Diosmine EG 600 mg)
- *Les autres composants sont* :

  Noyau : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, povidone K 25, carboxyméthylamidon sodique (type A), silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

  Pelliculage Diosmine EG 300 mg : opadry II 31F34852 (lactose monohydraté, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol 4000, oxyde de fer rouge).

  Pelliculage Diosmine EG 600 mg : opadry II 31F34851 (lactose monohydraté, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol 4000, oxyde de fer rouge, oxyde de fer noir, rouge cochenille A).

Titulaire/Exploitant :
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics
"Le Quintet" – Bât. A
12, rue Danjou
92517 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex

Fabricant :
Laboratoires ROTTENDORF PHARMA
Z.I. n°2 - Batterie 1000
59309 VALENCIENNES Cedex

1. QU'EST-CE QUE DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés.
VASCULOPROTECTEUR / MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES.
Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans :
- les troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher),
- la crise hémorroïdaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg comprimé pelliculé ?

DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé est généralement déconseillé pendant l'allaitement.

Prendre des précautions particulières avec DIOSMINE EG 600 mg, comprimé pelliculé :
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (*maladies métaboliques rares*).
- Si la gêne et la fragilité des vaisseaux ne diminuent pas en 15 jours, consultez votre médecin.
- Si les troubles hémorroïdaires persistent après quelques jours de traitement, il est indispensable de consulter votre médecin.
- Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.
- Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

La marche à pied et, éventuellement, le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, le traitement est déconseillé pendant la période d'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipients à effet notoire

- Diosmine EG 300 mg : lactose.
- Diosmine EG 600 mg : lactose, rouge cochenille A.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé ?

- Troubles de la circulation :
  * Diosmine EG 300 mg : 2 comprimés par jour.
  * Diosmine EG 600 mg : 1 comprimé par jour, le matin avant le petit déjeuner.
- Hémorroïdes :
  * Diosmine EG 300 mg : 4 à 6 comprimés par jour au moment des repas.
  * Diosmine EG 600 mg : 2 à 3 comprimés par jour au moment des repas.

Si vous avez l'impression que l'effet de DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, *consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

Voie orale.
Prendre le comprimé avec un demi-verre d'eau.

Les comprimés doivent être pris au moment des repas.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Si vous avez pris plus de DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû, *consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.*

Si vous oubliez de prendre DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé, *ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.*

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Diosmine EG 300 mg :
  * possibilité de troubles digestifs mineurs entraînant rarement l'arrêt du traitement.
- Diosmine EG 600 mg :
  * possibilité de troubles digestifs mineurs entraînant rarement l'arrêt du traitement.
  * en raison de la présence de rouge cochenille A, risque de réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DIOSMINE EG 300 mg et 600 mg, comprimé pelliculé ?

Pas de précautions particulières de conservation.
Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étui.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Mars 2005.

2NT099A