NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HÉMOCLAR® 0,5 POUR CENT Crème
polyester sulfurique de pentosane

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-là, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Dans cette notice :
1. Qu'est-ce que HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?
3. Comment utiliser HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PRODUIT LOCAL POUR LES DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES.
Ce médicament est préconisé en traitement local d'appoint des traumatismes bénins (bleus, coups) chez l'adulte et l'enfant à partir d'un an.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

N'utilisez jamais HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème dans les cas suivants :
- Antécédents d'allergie ou de baisse du nombre de plaquettes dans le sang suite à la prise d'un traitement anticoagulant par héparines ou par des produits apparentés à l'héparine.
- Allergie connue (hypersensibilité) aux autres constituants (parahydroxybenzoate de méthyle et propylèneglycol).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi
Pour usage externe exclusivement. Ne pas avaler.
- Ce médicament contient du propylèneglycol et peut provoquer des irritations de la peau.
- Ce médicament contient du "Parahydroxybenzoate" et peut provoquer des réactions allergiques.
- Arrêter le traitement en cas de réactions allergiques cutanées.

- Ne pas appliquer au voisinage immédiat des yeux, sur les muqueuses, sur les plaies, sur les brûlures, sur les lésions infectées ou les maladies de la peau suintantes.
- Bien se laver les mains après chaque utilisation (afin d'éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation d'autres médicaments
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

Liste des excipients à effet notoire : propylèneglycol (E1520), parahydroxybenzoate de méthyle (E218).

3. COMMENT UTILISER HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

Posologie
Appliquer 2 à 4 fois par jour sur la région à traiter en massant très légèrement pour faciliter la pénétration.

Mode et voie d'administration
Voie cutanée. Application locale.

Si vous avez utilisé plus de HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème que vous n'auriez dû et que vous sentez des effets non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Une utilisation excessive pourra entraîner une aggravation des effets indésirables, notamment l'irritation cutanée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

Possibilité de réactions allergiques localisées au point d'application.
En raison de la présence de propylèneglycol, ce médicament peut provoquer une irritation cutanée.
En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle, ce médicament peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

5. COMMENT CONSERVER HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

La substance active est :
Polyester sulfurique de pentosane ..... 0,500 g
pour 100 g de crème

Les autres composants sont : cire émulsionnante non ionique au cétostéaromacrogol, huile de maïs polyglycolysée, glycérol, propylèneglycol (E1520), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), acide lévulinique, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que HÉMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Crème, tube de 30 g.

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris – France
Information Patient : N° vert 0800 222 555
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

Sanofi Winthrop Industrie
45200 Amilly – France
ou
Unither Liquid Manufacturing
31770 Colomiers – France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : décembre 2010
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin :
Si vous avez besoin d'information ou de conseils supplémentaires.
Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce médicament est bien adapté à votre cas, en particulier :
- si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,

- si vous avez, en dehors de ce que vous voulez traiter par ce médicament, une autre maladie,
- si vous prenez d'autres médicaments en même temps, même s'ils sont vendus sans ordonnance,
- si vous avez déjà été allergique à un médicament.

Conseils de prévention à associer :

Les accidents pourraient être évités par des mesures de prévention adaptées :

- Aménagez votre maison pour éviter les risques de chute,
- Portez des équipements de protection adaptés lors de diverses activités (bricolage, activités sportives : gants, casque, protège-tibia, genouillères, chevillières, etc).

Signes d'alerte, nécessitant une consultation médicale :

N'essayez pas de vous prendre en charge vous-même si :

- les douleurs sont violentes, étendues ou entraînent un arrêt de l'activité,
- il est impossible de marcher ou de se servir du membre atteint,
- la zone blessée devient rouge, chaude et douloureuse,
- il semble qu'une poche liquide se soit formée,
- le choc a touché l'œil ou la proximité de l'œil,
- les signes sont apparus sans cause évidente, en l'absence d'un choc,
- vos signes persistent ou s'aggravent.

Ces signes peuvent être les symptômes d'une maladie/situation plus grave, pour laquelle un avis médical s'impose.