

Aftagel®

AFFECTIONS DE LA
MUQUEUSE BUCCALE, APHTES

AFTAGEL, gel buccal

Chlorhydrate de lidocaïne, sulfate de zinc

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que AFTAGEL, gel buccal et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser AFTAGEL, gel buccal ?
3. Comment utiliser AFTAGEL, gel buccal ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AFTAGEL, gel buccal ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE AFTAGEL, GEL BUCCAL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Anesthésique local

Préparation stomatologique

(A. appareil digestif et métabolisme)

Traitement local des lésions inflammatoires limitées de la muqueuse buccale et des aphtes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER AFTAGEL, GEL BUCCAL ?

N'utilisez jamais AFTAGEL, gel buccal dans les cas suivants : en cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux (lidocaïne).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec AFTAGEL, gel buccal :

Mises en garde spéciales

Ne pas utiliser de façon prolongée.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopage.

Informations importantes concernant certains composants de AFTAGEL, gel buccal

Liste des excipients à effet notoire :

Propylèneglycol

3. COMMENT UTILISER AFTAGEL, GEL BUCCAL ?

Posologie

Après s'être soigneusement lavé les mains, appliquer le gel sur le doigt et masser doucement le point buccal douloureux. Se laver les mains après application.

A renouveler si nécessaire.

Mode et voie d'administration

VOIE LOCALE.

Si vous avez utilisé plus d'AFTAGEL, gel buccal que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AFTAGEL, gel buccal est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet : réactions locales (irritations ou sensibilisation) possibles.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER AFTAGEL, GEL BUCCAL ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser AFTAGEL, gel buccal après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient AFTAGEL, gel buccal ?

Les substances actives sont :

Chlorhydrate de lidocaïne0,60000 g

Sulfate de zinc0,50000 g

Pour 100 ml de gel buccal

Les autres composants sont :

Glycérol, hydroxyéthylcellulose, arôme fraise LC 15096, saccharine sodique, huile essentielle de girofle, rouge cochenille A (E 124), eau purifiée

Qu'est-ce que AFTAGEL, gel buccal et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel buccal.

Tube de 15 ml

Titulaire / Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Fabricant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

2 RUE DE LA SAUSSAIE

77310 SAINT-FARDEAU PONTIERRY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21 février 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX

8995830/04