LOPÉRAMIDE MYLAN PHARMA 2 mg

chlorhydrate de lopéramide

DIARRHÉES AIGUËS

12 GÉLULES voie orale

Mylan SANTÉ FAMILIALE

> 15 ans

sur avis médical

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
Si les symptômes persistent après 2 jours de traitement, consultez votre médecin.
S'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. **Qu'est-ce que Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?**
2. **Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?**
3. **Comment prendre Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?**
4. **Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
5. **Comment conserver Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?**
6. **Informations supplémentaires**

1. Qu'est-ce que Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?

ANTI-DIARRHÉIQUE.

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des diarrhées aiguës passagères de l'adulte et de l'enfant à partir de 15 ans.
Le traitement est un complément des mesures diététiques : lire attentivement "Faites attention avec Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule".

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

⚠ Ne prenez jamais Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule dans les cas suivants :

- allergie à l'un des constituants,
- maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite hémorragique,
- enfant de moins de 15 ans.

En cas de doute, vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

M.120451-A-v2

Faites attention avec Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule

Mises en garde spéciales

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

ATTENTION : vous ne devez pas prendre ce médicament :

- en cas de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- si votre diarrhée survient au cours d'un traitement antibiotique *(risque d'atteinte sévère du côlon)*.

De même vous devez arrêter ce traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
- en cas d'apparition de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose *(maladies héréditaires rares)*.

Précautions d'emploi

Prenez l'avis de votre médecin en cas de maladie du foie car une surveillance médicale pendant le traitement est nécessaire.
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de diarrhée survenant au cours d'un traitement antibiotique *(risque de colite pseudo-membraneuse)*.
L'administration de ce médicament doit être interrompue en cas de constipation ou de distension abdominale.

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.
Il est nécessaire de :

- se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée *(la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres)*.
- s'alimenter le temps de la diarrhée,
  - en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés,
  - en privilégiant les viandes grillées, le riz.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient du lopéramide. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir "Comment prendre Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?").

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges. L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de certaines machines, sur les risques éventuels attachés à l'emploi de ce médicament.

Informations importantes concernant certains composants de Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule

Ce médicament contient du lactose.

3. Comment prendre Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 15 ans.

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 15 ans.

Commencez par 2 gélules en une seule prise (soit 4 mg de lopéramide).
Si la diarrhée continue, après chaque selle non moulée, prenez 1 gélule supplémentaire mais :
- ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
- ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Mode d'administration

Voie orale.
Avaler les gélules avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Après chaque selle non moulée, une gélule supplémentaire sera administrée, sans dépasser 6 gélules par jour.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

Si vous avez pris plus de Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule que vous n'auriez dû
En cas de surdosage accidentel, arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :
- constipation et/ou distension du ventre,
- douleurs du ventre, ballonnement, nausées, vomissements, sécheresse de la bouche,
- réactions allergiques (y compris éruption cutanée),
- fatigue, somnolence, vertiges,
- rétention urinaire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule ?

La substance active est :
chlorhydrate de lopéramide ..... 2,00 mg
Quantité correspondant
à lopéramide base ..... 1,86 mg
Pour une gélule.
Les autres composants sont : lactose monohydraté, amidon de riz, talc, stéarate de magnésium.
Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane.

Qu'est-ce que Lopéramide Mylan Pharma 2 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule.
Boîte de 12.

Titulaire - Exploitant :
MYLAN S.A.S.
117 Allée des Parcs
69800 SAINT-PRIEST
FRANCE

Fabricant :
Laboratoires BTT
Z.I. de Krafft
67150 ERSTEIN
FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 07/2012

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Conseils - Education sanitaire

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.

Ce traitement contre les symptômes des diarrhées aiguës ne dispense pas d'une réhydratation importante, accompagnée d'une hygiène diététique si nécessaire *(préférez boissons sucrées, bouillons salés, évitez lait, légumes verts, crudités, fruits, épices)* jusqu'à disparition des diarrhées.